

“Colmillos”, “Arrayán”

Cavendishia bracteata

Familia Ericaceae

El nombre de colmillos proviene de sus flores tubulares blancas con la base rosado cerosa que crecen en pequeños ramos y que antes de abrirse realmente parecen colmillos saliendo de las encías. Las flores primero aparecen cubiertas por brácteas grande rosado ceroso. Al abrirse las



flores presentan cerca del extremo una constricción y el extremo del tubo floral se abre como una estrellita de 5 brazos cortos.

Las hojas son de color verde intenso, gruesas de unos 12 cm. de largo y con 5-7 venas que salen cerca de la base.

Sus néctar son un recurso alimenticio importante para colibríes como *Panterpe insignis*, *Colibri thalassinus*, *Lampornis cinereicauda*, *L. castaneiventris* y *Eugenes fulgens*, además para el “robador de néctar” *Diglossa plúmbea*.

Sus frutos son apetecidos por, *Pseliophorus tibialis* (Emberizidae), *Phainoptila melanoxantha* (Ptiligonathidae) *Chlorospingus pileatus* (nota ahora en la familia Emberizidae), *Chlorophonia callophrys* (Fringillidae).

Bibliografía

Zuchowski W. 2007 . *Tropical Plants of Costa Rica, a guide to native and exotic flora*. A Zona Tropical. Cornell University Press. Ithaca N.Y.

Jorge Serrano Salazar, comunicación personal, Paraíso del Quetzal, Km 70